NÉOSYNÉPHRINE 10% FAURE

Chlorhydrate de phényléphrine
Collyre en solution en récipient unidose

IDENTIFICATION DU MÉDICAMENT
Dénomination
Néosynéphrine 10 % FAURE, collyre en solution en récipient unidose
Composition
Chlorhydrate de phényléphrine .....40 mg
Acide borique, borax, édétate disodique, eau purifiée q.s.p. 0,4 ml
Forme pharmaceutique
Collyre en solution en récipient unidose de 0,4 ml, boîte de 100.
Classe Pharmaco-Thérapeutique
MYDRIATIQUE SYMPATHOMIMETIQUE ALPHA (S : organes sensoriels)
Titulaire/Exploitant
Laboratoires EUROPHTA – 2, rue du Gabian – MC 98000 Monaco
Tel : 00 377 97 77 72 72
Fabricant
EXCELVISION – Rue de la Lombardière – 07100 Annonay – France
DANS QUEL(S) CAS UTILISER CE MÉDICAMENT (Indications thérapeutiques)
Ce collyre est indiqué pour obtenir une mydriase (dilatation de la pupille) dans le cadre d'un diagnostic, d'un traitement ou d'une chirurgie oculaire.
ATTENTION!
Dans quel(s) cas ne pas utiliser ce médicament (Contre-indications)
Ce médicament NE DOIT PAS ETRE UTILISÉ dans les cas suivants :
- allergie connue à l'un des constituants du collyre,
- risque de glaucome aigu (augmentation brutale de la pression intra-oculaire).

Ce médicament NE DOIT PAS ETRE ADMINISTRE :
- en association avec d'autres vasoconstricteurs (phénylpropanolamine, pseudoéphédrine, phényléphrine, méthylphénidate).

Ce médicament ne doit GÉNÉRALEMENT pas être utilisé, sauf avis contraire du médecin, dans les cas suivants :
- pendant le premier trimestre de la grossesse et l'allaitement,
- en cas de traitement avec la bromocriptine, la guanéthidine, certains antidépresseurs (IMAO non sélectifs).

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.
Mises en garde spéciales
Ne pas injecter.
Le collyre ne doit pas être administré en injection péri ou intra-oculaire.
Ce collyre ne doit en aucun cas être laissé à la portée des enfants.
Ne pas utiliser ce médicament chez le nouveau-né.
Précautions d'emploi
En cas de réaction allergique, prévenez le médecin.
Chez certaines personnes prédisposées, les mydriatiques sont susceptibles de déclencher une crise de glaucome aigu (par augmentation brutale de la pression dans l'œil).
En cas d'hypertension artérielle, d'athérosclérose (épaississement de la paroi des artères), de maladie cardiaque et d'hyperthyroïdie (activité exagérée de la glande thyroïde), prévenez le médecin.
En cas de traitement concomitant par un autre collyre, espacer de 15 minutes les instillations.
Du fait de la présence de phényléphrine, le port de lentilles de contact hydrophiles souples est déconseillé pendant le traitement.
EN CAS DE DOUTE, N'HÉSITEZ PAS A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.
Interactions médicamenteuses et autres interactions
AFIN D'ÉVITER D'ÉVENTUELLES INTÉRACTIONS ENTRE PLUSIEURS MÉDICAMENTS, notamment avec la phénylpropanolamine, la pseudoéphédrine, la phényléphrine, le méthylphénidate, la bromocriptine, la guanéthidine, avec certains antidépresseurs (IMAO non sélectifs),
SIGNALEZ SYSTÉMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS À VOTRE MÉDECIN OU À VOTRE PHARMACIEN.
Grossesse - Allaitement
L'utilisation de ce médicament est déconseillée pendant le premier trimestre de la grossesse.
Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez rapidement votre médecin : lui seul pourra adapter le traitement à votre état.
Ce médicament ne sera utilisé pendant le deuxième et le troisième trimestre de la grossesse que sur les conseils de votre médecin.

EUROPHTA
2, rue du Gabian
98000 MONACO
✆ 00 377 97 77 72 72

23147300

Noir U

Il n'existe pas de données concernant le passage dans le lait maternel. En raison de possibles effets néfastes chez le nourrisson, l'utilisation de ce médicament est déconseillée dans le cas où vous allaitez.
D'UNE FAÇON GÉNÉRALE, IL CONVIENT AU COURS DE LA GROSSESSE ET DE L'ALLAITEMENT DE TOUJOURS DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN AVANT D'UTILISER UN MÉDICAMENT.

Conducteurs et utilisateurs de machines

L'instillation de ce collyre entraîne des troubles visuels gênants (éblouissement) pendant quelques heures.
En conséquence, vous ne devez pas conduire de véhicules et/ou utiliser des machines pendant toute la durée des troubles visuels.

Sportifs

L'attention des sportifs sera attirée sur le fait que cette spécialité contient un principe actif (phényléphrine) pouvant induire une réaction positive des tests pratiqués lors des contrôles antidopages.

COMMENT UTILISER CE MÉDICAMENT

Posologie

En moyenne suivant les cas : 1, 2 ou 3 instillations à 10 minutes d'intervalle afin d'obtenir la dilatation pupillaire désirée.

Mode et voie d'administration

Voie ophtalmique
Mode d'emploi :
- lavez-vous soigneusement les mains avant de procéder à l'application,
- évitez le contact de l'embout du flacon avec l'œil ou les paupières,
- instillez la goutte de collyre dans le cul de sac conjonctival, en tirant légèrement la paupière inférieure vers le bas et en regardant en haut,
- jetez l'unidose immédiatement après utilisation. Ne pas réutiliser un récipient unidose déjà entamé.

Fréquence et moment auquel le médicament doit être administré

Conformez-vous strictement à la prescription médicale.

Durée du traitement

Conformez-vous strictement à la prescription médicale.

Conduite à tenir en cas de surdosage

Contactez immédiatement votre médecin.

EFFETS NON SOUHAITÉS ET GENANTS (effets indésirables)

COMME TOUT PRODUIT ACTIF, CE MÉDICAMENT PEUT ENTRAINER CHEZ CERTAINES PERSONNES DES EFFETS PLUS OU MOINS GENANTS :
Ce médicament peut entraîner des troubles visuels gênants (éblouissement dû à la dilatation pupillaire).
Ce médicament peut déclencher une crise de glaucome aigu : en cas d'apparition de symptômes anormaux après instillation (rougeur, douleur, trouble de la vision), consultez immédiatement un médecin.
Possibilité d'irritation transitoire, de picotements.
Possibilité de réactions allergiques : blépharite (inflammation des paupières), conjonctivite, kératite ponctuée superficielle (inflammation de la conjonctive, de la cornée de l'œil).
Si vous (ou votre enfant) savez que vous êtes allergique à certains produits, prévenez votre médecin.
Ce médicament peut entraîner un malaise général : une élévation de la pression artérielle, des palpitations, des maux de tête, une pâleur, des tremblements.
SIGNALEZ A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN TOUT EFFET NON SOUHAITÉ ET GENANT QUI NE SERAIT PAS MENTIONNÉ DANS CETTE NOTICE.

CONSERVATION

NE PAS DÉPASSER LA DATE LIMITE D'UTILISATION FIGURANT SUR LE CONDITIONNEMENT EXTÉRIEUR.

Précautions particulières de conservation

Jeter immédiatement l'unidose après utilisation.
Ne pas réutiliser un récipient unidose déjà entamé.

Date de révision de la notice : Août 2004

EUROPHTA
2, rue du Gabian
98000 MONACO
✆ 00 377 97 77 72 72

23147300

Noir U